

# Zboża



## WYSIEW NAWOZU w kg na ha

Przed lub po siewie, względnie przed ruszeniem vegetacji

- 200-300 kg/ha **AKRA Granulat Kombi**

Przed/ w okresie vegetacji

- N-azot: według zapotrzebowania


## OPRYSK na ha

Faza rozwoju EC 21-32 (jesień i/lub wiosna)

- 0,5 l **AKRA Plus 9**
- 2 l **AKRA Blatt**
- 3 kg N-azotu (Mocznik, RSM)
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 25% zalecanej dawki \*)
- Ilość wody min. 200 l

Faza rozwoju EC 37-65

- 0,5 l **AKRA Plus 9**
- 2 l **AKRA Blatt**
- 6 kg N-azotu (Mocznik, RSM)
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki \*)
- Ilość wody min. 200 l



**EC 21** - początek krzewienia, widoczny pierwszy pęd  
**EC 32** - faza drugiego kolanka. Drugie kolanko znajduje się w odległości przynajmniej 2 cm od pierwszego kolanka

**EC 37** - rozwój liścia flagowego. Liść jeszcze zwinięty.  
**EC 65** - pełnia fazy kwitnienia

**Wskazówka:** przy zastosowaniu regulatorów wzrostu w fazie rozwoju EC 23, należy wykonać próbę mieszaną z wyżej wymienionymi roztworami.

\*) Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.